

BDEX

INJECTION



BDEX

INJECTION

COMPOSITION:

Each ml contains	
Benzyl Penicillin Procaine (USP)	125,000 IU
Benzathine Penicillin G (BP)	125,000 IU
Dihydrostreptomycin Sulphate (BP Vet)	0.25g
Dexamethasone Sodium Phosphate (BP)	0.20mg
Dexamethasone -21-Isonicotinate (BP)	0.20mg

INDICATIONS:

BDEX Injection is indicated for the treatment of inflammatory conditions, arthritis, mastitis, respiratory, gastrointestinal and urinary tract infections caused by penicillin and dihydrostreptomycin sensitive microorganisms in ruminants.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

BDEX injection is an association of penicillin, dihydrostreptomycin and dexamethasone formulated in such a manner to obtain broad spectrum long lasting action. Procaine Penicillin G and benzathine Penicillin G are small spectrum penicillin which have bactericidal action against mainly gram positive bacteria like Clostridium, Corynebacterium, Erysipelothrix, Listeria, penicillinase negative Staphylococcus and Streptococcus spp.

Dihydrostreptomycin is an aminoglycoside antibiotic with bactericidal action against mainly gram negative bacteria like E. coli, Campylobacter, Klebsiella, Haemophilus, Pasteurella and Salmonella spp.

Dexamethasone is a synthetic glucocorticoid hormone which has potent anti-inflammatory and diversified hormonal and metabolic action.

DOSAGE & ADMINISTRATION:

Administer the following dose by deep intramuscular injection only.

Cattle / Buffalo: 10ml/100kg body weight.

Sheep / Goat: 1ml/10 kg body weight.

Repeat the dose every 48 hours.

PRECAUTIONS:

Consult veterinarian before use.

Store below 25°C in cool and dry place.

Do not administer in pregnant animals.

Do not administer in animals sensitive to penicillin.

Withdrawal Period: Meat: 30 days, Milk: 3 days.

صرف جانوروں کے استعمال کیلئے



بیڈیکس انجیکشن

اجزاء: ہر ملی لیٹر میں شامل ہے۔

بینزائل پینسیلین پروکین جی (یو۔ ایس۔ پی) ----- 125,000 آئی۔ یو۔

بینزاتھائن پینسیلین جی (بی پی) ----- 125,000 آئی۔ یو۔

ڈائی ہائیڈروسٹریپٹومیسین سلفیٹ (بی پی ویٹ) ----- 0.25 گرام

ڈیکسامیٹھاسون سوڈیم فاسفیٹ (بی پی) ----- 0.20 ملی گرام

ڈیکسامیٹھاسون -21-آئیسونیکوٹینٹ (بی پی) ----- 0.20 ملی گرام

علامات:

بیڈیکس انجیکشن مویشیوں میں بخار، درد سوزش، جوڑوں کے درد، حوانہ کی سوزش،

سانس لینے میں دشواری اور دیگر نظام انہضام کی بیماریوں کیلئے انتہائی موثر ہے۔

خوراک و طریقہ استعمال:

مندرجہ ذیل خوراک پٹوں میں انجیکشن لگائیں۔

گائے / بھینس: 10 ملی لیٹر فی 100 کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق۔

بھیڑ / بکری: 1 ملی گرام فی 10 کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق۔

ضرورت پیش آنے پر 48 گھنٹوں بعد دوبارہ انجیکشن لگائیں۔

احتیاطی تدابیر:

ویٹری ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

25°C سے کم ٹھنڈی اور خشک جگہ پر محفوظ رکھیں۔

حاملہ جانوروں میں استعمال نہ کریں۔

پینسیلین سے حساسیت رکھنے والے جانوروں میں استعمال نہ کریں۔

30 دن تک گوشت اور 3 دن تک دودھ استعمال نہ کریں۔



Head Office : SPL House, 82-R1, M. A. Johar Town, Lahore - Pakistan
Tel : + 92 42 35291774-5, 35314161 Fax : +92 42 35291776
E.mail : info@selmorepharma.com, sales@selmorepharma.com
www.selmorepharma.com



ISO Certified Company