



سوزشِ حوانہ / ساڑو

تھنوں کی تباہی کی ایک بڑی وجہ





سوزش حوانہ / ساڑو

اس بیماری میں حوانے میں سوجن ہوتی ہے اور دودھ میں کیمیائی، طبی اور حیاتیاتی تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں۔



دبہات

- 1- جانور کے ارد گرد موجود بیکٹیریا کے باعث
- 2- فنگس (پھپھوندی) کے باعث
- 3- زخم، چوٹ اور غلط طریقے سے دودھ دوہنے کے باعث
- 4- عمر، موسمی اثرات اور بچہ دانی کی سوزش تھنوں کے دفاعی نظام کو کمزور کر دیتے ہیں۔

ساڑو کی بیماری دو حالتوں میں ہو سکتی ہے:

- 1- مخفی سوزش حوانہ
- 2- ظاہری سوزش حوانہ (دو حالتوں میں دیکھی جاسکتی ہے)۔
- (1) نئی اور شدید حالت (2) پرانی حالت



نقصان

- 1- ایسا دودھ انسانی صحت کے لئے بے حد مضر ہو سکتا ہے۔
- 2- ایک یا ایک سے زیادہ تھن ناکارہ ہو سکتے ہیں۔





مخفی سوزشِ حوانہ

سازو کی یہ حالت بظاہر ہماری کسان بہنوں اور بھائیوں کو نظر نہیں آتی۔ اس میں نہ تو تھن سوجتا ہے، نہ ہی دودھ کی رنگت میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے مگر دودھ میں جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ ظاہری سوزشِ حوانہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

سرف ٹیٹ

سرف ٹیٹ ایک نہایت ہی آسان اور سستا طریقہ ہے، جو ہماری دیہاتی بہنیں سہولت سے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے گھروں میں کر سکتی ہیں اور سازو جیسی بیماری کے حملے سے اپنے مویشیوں کو محفوظ رکھ کر پیداوار کے ایک بڑے نقصان سے بچ سکتی ہیں۔



طریقہ

پانی : ایک گلاس
سرف : کھانے کے دو یا تین بڑے چمچ
چائے کی پیالیاں : 4 عدد



1- پانی اور سرف کا گڑھا مخلول بنا لیں۔



2- اب چاروں تھنوں کا دودھ چار علیحدہ علیحدہ





نوٹ:

1- چاروں پیالیوں میں چار علیحدہ علیحدہ تھنوں کا دودھ لیں تاکہ بیمار تھن کا بخوبی اندازہ کیا جاسکے۔



2- کس کرنے کے بعد دودھ کچی مٹی یا کالے کپڑے پر پھینکیں تو اس سے پھنکیوں کا اندازہ لگانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔



3- پیالیوں میں لیں۔ جتنا دودھ لیں گے، اتنی ہی مقدار اس میں سرف طے محلول کی ملا دیں۔ اگر دودھ کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی پھنکیاں نظر آتی ہیں تو مویشی



کے اس تھن میں سوزش حوانہ کا حملہ ہو چکا ہے اور آپ کو اس کا فوراً علاج شروع کرنا ہوگا۔





- 3- اگر ان تدابیر سے اتفاق نہ ہو تو 5 سے 6 دن براڈ پیکٹرم اینٹی بائیوٹک کا ٹیکہ لگا کر علاج کریں۔
- 4- سرف ٹیسٹ ہر پندرہ دن بعد ضرور کریں۔

ظاہری سوزشِ حوانہ

بیماری کی نئی اور شدید حالت

مخفی حالت کا اگر علاج نہ کیا جائے تو بیماری کی ظاہری حالت زورنا ہو جاتی ہے، جس میں آپ کو مندرجہ ذیل علامات نظر آئیں گی:-

- 1- حوانہ میں سوجن ہوگی۔
- 2- ہاتھ لگانے پر حوانہ گرم اور سرخ محسوس ہوگا۔
- 3- جانور کو درد ہوگا۔
- 4- بخار کی کیفیت ہوگی۔
- 5- دودھ کی رنگت بھی پہلی ہوگی۔

دیسی نسخہ

ایسی صورت میں مندرجہ ذیل دیسی نسخہ جات بھی دیئے جاسکتے ہیں:-

1- لہسن کی کھیر تیار کر کے دیں۔



- 2- آدھ کلو لیموں کے چار چار ٹکڑے کاٹ لیں اور رات بھر پڑے رہنے دیں۔ صبح ایک چھٹانک نوشادر میں ملا کر دیں۔






2- درد اور سوجن ختم کرنے کا ٹیکہ ڈائاکلو فینک
سوڈیم لگائیں۔



6- بعض اوقات مہنگیاں بھی زونما ہوں گی۔



3- بعض اوقات جانوروں میں بچہ دینے سے
تین دن پہلے زیادہ دودھ کی وجہ سے حوانہ



علاج

1- 5 یا 6 دن براڈ پیکیٹرم اینٹی بائیوٹک کا کورس
کروائیں۔





2- دودھ آنا بند ہو جاتا ہے یا رگ رگ کر آتا

ہے۔

3- تھن میں مروڑی بن جاتی ہے۔



4- ناز پڑ سکتی ہے۔

5- بعض اوقات تھن سکڑ کر اوپر چڑھ جاتا ہے۔



پر سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ سوزش پانی نما ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں حوانہ پر ٹھنڈی نکلور کریں اور پیشاب آور دوائی استعمال کریں۔

بیماری کی پرانی حالت

ایسی صورت میں علاج کرنے سے بہتری کی امید کم ہوتی ہے، لہذا بہتر ہے کہ جانور کا ابتدائی مرحلے میں ہی علاج کر لیا جائے۔

علامات

1- تھن یا پورا حوانہ سخت ہو جاتا ہے۔





جانور کو اچھی طرح صاف کریں



دو دنے والی جگہ صاف اور خشک ہو



پوائی سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں

6- تھن چٹ کر زخم بھی ہو سکتے ہیں۔

علاج

1- براڈ پیکٹرم اینٹی بائیوٹک کا 5 سے 6 دن کا کورس کروائیں۔

2- اگر تھن پر زخم بن چکا ہو تو پہلے زخم پر پائوڈین (pyodin) لگا کر صاف کریں اور پھر پینسلین کا ٹیکہ ویزلین میں ملا کر زخم یا چیرے پر لگائیں۔

نوٹ: سخت ناز پڑنے اور تھن سٹکو کر اؤپر چڑھنے کی صورت میں یہ مرض لا علاج ہے مگر باقی تھنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے علاج ضرور کروائیں۔

اہم احتیاط: ساڑھ کی بیماری سے بچاؤ کے لیے دو دنے کا درست طریقہ اختیار کرنا بے حد اہم اور ضروری ہے، جو مندرجہ ذیل ہے:-





ہاتھ اور انگوٹھے کی پوزیشن صحیح رکھ کر چرائی کریں



ہاتھ صاف کپڑے سے اچھی طرح خشک کریں



ہاتھ دھونے کے بعد

- حفاظتی تدابیر**
- 1- مویشی کی صفائی، اس کے حوانہ کی صفائی اور گوالے کے ہاتھوں اور برتنوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔
 - 2- دودھ دوہنے کا صحیح طریقہ اختیار کریں۔ (انگوٹھا موز کر دودھ دوہنا بھی حوانے کی سوزش کا باعث بنتا ہے)۔



حوانے کو دھو کر اچھی طرح خشک کر لیں





- 6- دودھ دوہتے وقت اور اس کے کچھ دیر بعد تک جانور کو چارہ یا دھنڈا ڈال کر کھڑا رکھیں تاکہ جراثیم تھنوں کے اندر نہ جا سکیں۔
- 7- جانور خریدنے کے وقت حوانے کی بناوٹ اور جانور کی عمر کا خیال رکھیں۔
- 8- نئے جانور کو ریوڑ میں شامل کرنے سے پہلے صرف ٹیسٹ کے ذریعے مخفی سوزش حوانہ کی تشخیص کر لیں۔
- 9- جانور کو خشک اور صاف جگہ پر باندھیں۔
- 10- ہر چھ گھنٹے بعد متاثرہ تھن کو خالی کریں۔
- 11- دودھ دوہتے وقت متاثرہ تھن کو آخر میں چھوئیں۔
- 12- متاثرہ تھن کا دودھ استعمال کرنے سے گریز کریں۔

نوٹ : بھیڑ بکریوں میں سوزش حوانہ کی علامات، گائے/بھینس کے سوزش حوانہ سے متشابہ ہیں۔



- 3- چوائی کے وقت حوانہ پورا خالی کرنا چاہیے۔
- 4- تھن کے زخم کی صورت میں نچر آئیڈین یا پنسلین اور ویزلین کی مرہم لگائیں۔



- 5- دودھ دوہنے سے پہلے اور بعد میں تھن جراثیم کش ادویات میں ڈبوئیں۔

