



ICI PAKISTAN LTD.

NEOSULPH (Neomycin Sulphate)

ORAL POWDER



Farmer's
Choice

COMPOSITION:

Each 100gm Contains:-
Neomycin Sulphate 72gm
(As per Innovator's Specification)

INDICATION:

Neosulph powder is indicated for the prevention and treatment of gastrointestinal infections like bacterial enteritis caused by Escherichia coli, Salmonella and Campylobacter species. It is also effective against early chick mortality, chronic respiratory disease (CRD) and pneumonia.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES:

Neosulph is a broad-spectrum bactericidal aminoglycoside antibiotic which has an excellent activity against gram-negative, and has partial activity against gram-positive bacteria. Neosulph powder is poorly absorbed from gastrointestinal tract. The small absorbed fraction is rapidly distributed in the tissues and is excreted through kidneys in keeping with the degree of kidney fraction. The growth of intestinal bacteria is rapidly suppressed following oral administration of neomycin and persist for 48-72 hours. Neomycin acts on ribosomal level and inhibits the bacterial protein synthesis.

DOSAGE & ADMINISTRATION:

(Orally in drinking water)
1 gm per 10 Litre of drinking water for 3-5 days.

WITHDRAWAL TIME:

Poultry: Meat 7 days.

PRECAUTIONS:

Store below 25°C in a cool & dry place.
Keep jar tightly closed after use.
Keep out of the reach of children.

نیوسلف: (پانی میں حل پذیر پاؤڈر)

ہر 100 گرام میں شامل اجزاء:

نیومائی سین سلفیٹ 72 گرام

علامات:

نیوسلف پاؤڈر بریڈرز، لیر زاور براکس میں بیکٹریا کے حملہ آور ہونے سے پیدا ہونے والی آنتوں کی سوزش دور کرنے کیلئے بہترین دوا ہے۔ نیوسلف کا انتہائی طاقتور جزو نیومائسین خوراک کی نالیوں میں موجود رہتے ہوئے جراثیم کا براہ راست خاتمہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک کی نالیوں کو پتلا کرتی ہے تاکہ خوراک زیادہ مقدار میں جذب ہو کر پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرے۔ دوا کی بیج جانے والی مقدار "بیٹھ" کے ذریعے "لٹر" میں چلی جاتی ہے اور لٹر میں موجود جراثیم کا خاتمہ کرتی ہے جس سے لٹر کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے اور مرغیاں مزید بیماریوں کے حملہ سے بچ جاتی ہیں۔

خوراک و استعمال: (صرف پلانے کیلئے)

1 گرام 10 لیٹر پینے کے پانی میں 3 سے 5 روز۔

احتیاط:

جانور ذبح کرنے سے کم از کم 7 دن پہلے دوا کا استعمال ترک کریں۔

احتیاطی تدابیر:

دوا کو خشک اور ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔

استعمال کے بعد ڈبے کو اچھی طرح بند کر کے رکھیں۔

بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔



MANUFACTURED & MARKED BY:
ICI PAKISTAN LTD.

Animal Health Division
Life Sciences Business