

# VETY FASCIOL

## LIVERFLUKE DRENCH

Oxyclozanide: 3.4%  
Cobalt Chloride: 0.075%  
Sodium Selenite: 0.035%

## ویٹی فیسئیول

- **Vety-Fasciol** helps increase weight gain, milk production and meat quality by eliminating health injurious flukes through regular deworming programme.

ویٹی فیسئیول جانور کے جگر میں موجود بزرگوں کو ختم کر کے جانور کو صحت یاب بناتا ہے اور جانور کے وزن کے ساتھ ساتھ دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔

- **Vety-Fasciol** has been shown to be effective in all types of livestock including milking & pregnant animals, based on prescribed dose.

ویٹی فیسئیول ہر طرح کے جانوروں کیلئے مؤثر ہے حتیٰ کہ اسے دودھیل اور حاملہ جانوروں میں تاکید کردہ مقدار میں بھی لگایا جاسکتا ہے۔

- **Vety-Fasciol** is easy to administer.

ویٹی فیسئیول کا ترکیب استعمال انتہائی آسان ہے۔

- **Vety-Fasciol** Contains cobalt: eliminates anaemic conditions.

ویٹی فیسئیول میں شامل کو بالٹ خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔

- **Vety-Fasciol** Contains selenium: gives extra wool and body-shine. Enhances resistance to infectious diseases.

ویٹی فیسئیول میں سلیسینیم شامل ہے جو جانور کی کھال میں چمک اور عمدہ اون کی پیداوار کا سبب بنتا ہے اور جانور میں دوسری بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔

- **Vety-Fasciol** is economical.

مناسب دام میں دستیاب ہے۔

### Dosage & Use

Cattle & Buffalo 15 ml/50 Kg B.W.  
Sheep & Goat 5ml/15KgB.W.

### Packing

100 ml Bottle, 250 ml Bottle, 1000 ml Bottle

**Note:** Shake well before use.



**Leads**  
Pharma

Manufactured & Marketed By:

**Leads Pharma (Pvt) Limited (Vet Div)**

Head Office: 81-A, St.# 6, I-10/3 Islamabad, Pakistan. Ph: 92-51-4441081

Fax: 92-51-4441080 Website: www.leadspharma.com

Marketing Office: 14-B 1st Floor Agro Base Flats, Shadman Market, Lahore.

Ph: 92-42-37425362 UAN: 111-103-103

# Minazin PF

## Injection

### Composition:

Each ml contains  
Diminazine Aceturate.....105mg  
Antipyrine.....131mg

### Characteristics:

Minazina PF Injection is the combination of diminazine acetate, an anti-trypanosomiasis and antipyretic, and antipyrine, an analgesic and antipyretic. It provides effective control in the treatment of trypanosomiasis and babesiosis along with bactericidal activity. Addition of antipyrine with diminazine provides analgesic and antipyretic action.

The combination is most effective and latest which has been accepted through out the world as the first choice of treatment and control of trypanosomiasis and babesiosis in the livestock industry.

### Indications:

TRYPANOSOMIASIS: Is a disease, which affect all the domestic animals, caused by protozoa of the genus trypanosoma. The major species are T-congolense, T-vivax, T-brucei and T-simiae. In the order of importance, those effecting cattle, sheep and goats are T-congolense, T-vivax and T-brucei. In dogs and cats, T-brucei probably is the most important. However it is difficult to assign an order of importance for horses and camels. In addition to Trypanocidal activity, it is babesicidal and bactericidal (mainly brucella and streptococcus species), It is also effective against Piroplasma, babesia bovis, B-bigemina, B-ovis, B-motasi, B-canis and other species like Nuttella equi and theileria annulata.

Antipyrine being a powerful antipyretic, analgesic and anti-inflammatory drug is used to give symptomatic relief from muscle, bone and joint lesions. It is of great value as adjuncts to primary therapy, septic or endotoxic shock describes the spectrum of changes found in and animal suffering trypanosomiasis.

### Dosage and Administration:

Administer the following dose by deep intramuscular injection only.

Animal	Dose
Cow/Bufalo	10ml per 300 kg BW
Horse/Donkey	10ml per 300 kg BW
Sheep/Goat	0.3ml per 10 kg BW

In case of infestation due to Trypanosoma brucei, the dose must be doubled. In Surra, if required the dose may be repeated on third day.

### Presentation:

10ml, 50ml

**For Veterinary Use Only**

## مینازین پی ایف انجکشن

ٹریپانوسومی ایسز اور پیسی سیوسز کے خلاف مؤثر ہتھیار

### Infringing Fatal Activities of Trypanosomiasis & Babesia

خوارک اور طریقہ استعمال:

بذریعہ انجکشن گوشت میں لگایا جاسکتا ہے۔

ٹریپانوسومہ، بے بیزیہ، ٹرائیکوموناس اور پارو بلازمہ انفیکشن کیلئے عمومی خوراک:

3.5 ملی گرام (Diminazine) فی کلوگرام جسمانی وزن کیلئے یا 43 ملی لیٹر مینازین-PF فی کلوگرام جسمانی وزن کیلئے

بوقت ضرورت:

دوا کی مقدار دوگنی کی جاسکتی ہے یعنی 1 ملی لیٹر فی 21.5 کلوگرام جسمانی وزن کیلئے صرف گائے، بھینس، بھیر، اونٹ، گھوڑا اور کتوں میں استعمال کریں۔

ادویاتی احتیاط:

20 دن تک گوشت اور 3 دن تک دودھ استعمال نہ کریں۔

ٹھنڈی اور خشک جگہ 28 C سے کم درجہ حرارت پر رکھیں۔

روشنی سے محفوظ رکھیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

اگر سلوشن میں کرٹلن نظر آئیں تو بوتل کو نیم گرم پانی میں رکھ کر گرم کریں۔ جب تک کرٹلن حل ہو جائیں۔

**Leads Pharma**

Manufactured & Marketed By:

**Leads Pharma (Pvt) Limited (Vet Div)**

Head Office: 81-A St. # 6 I-1/3 Islamabad, Pakistan. Ph: 92-51-4441081

Fax: 92-51-4441080 Website: www.leadspharma.com

Marketing Office: 14-B 1st Floor Agro Base Flats, Shadman Market, Lahore.

Ph: 92-42-37425362 UAN: 111-103-103