

منافع بڑھانا

Bringing Animal Potential To Life

اوکسینازول پلس پلاٹو

# Oxanazole Plus

Oral Suspension

اوکسینازول پلس اورل سسپینشن  
اہمیت:

جانوروں کے پیٹ اور آنتوں میں موجود گول اور فیتا نما کرم، جگر اور پھیپھڑوں کے کرم جو کہ جانور کی تیار شدہ خوراک کو استعمال کر کے جانور کو کمزور اور لاغر بنا دیتے ہیں لہذا

جانور کو نقصان پہنچانے والے ایسے تمام کرموں کے خلاف اوکسینازول پلس ہی واحد حل ہے



- جانور کو پیش لگ جاتے ہیں
- خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے
- جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے

- سانس لینے میں دشواری
- ناک اور منہ سے خون یا رطوبت کا آنا
- کھانسی کا آنا

**اب ان سب سے چھٹکارا ممکن ہے**

صرف اوکسینازول پلس کے استعمال سے:

جانور جلد صحت یاب ہو کر دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھاتے ہیں  
بیمار اور لاغر جانور صحت مند اور طاقتور بن جاتے ہیں  
اوکسینازول پلس کسان کی آمدنی میں اضافہ کرتی ہے

نوٹ:

اپنے جانوروں سے بہترین پیداوار حاصل کرنے کے لیے بڑے جانوروں کو ہر چھ ماہ بعد اور چھوٹے جانوروں کو ہر چار ماہ بعد اوکسینازول پلس ضرور پلائیں۔



1019 - بی، پی، ایس۔ آئی۔ ای، سرگودھا روڈ فیصل آباد۔ پاکستان  
فون: +92-41-8810170, 8586787، فیکس: +92-41-8869292

تیار کردہ:  
صنعا لیبارٹریز



# Oxanzole Plus

Oral Suspension

Sanna Laboratories

**COMPOSITION:** Each ml contains:-

Oxyclozanide B.P. (Vet) ..... 62.50 mg      Oxfendazole B.P. .... 22.65 mg

**INDICATIONS:**

Oxanzole Plus Oral Suspension is indicated for the control and treatment of chronic fascioliasis, lungworms, tapeworms, mature and immature gastrointestinal roundworms, in cattle, buffalo, sheep and goat. It is larvicidal and ovicidal against nematodes. Oxanzole Plus Oral Suspension particularly removes all flukes (*Fasciola* spp) present in bile duct of liver.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

Cattle / buffalo: 5 ml per 25 kg body weight (Drench).

Sheep / Goat: 1 ml per 4.5 kg body weight (Drench).

**PRECAUTIONS:**

Direct contact with the skin should be avoided. Wear rubber gloves, wash hands after use. Administer preferably with drenching gun. Do not consume milk for 5 days and meat for 14 days after administration. Store at room temperature. Avoid exposure to direct sunlight. Keep out of reach of children.



اورل سسپینشن  
اوکسینازول پلس

مقدار خوراک / طریقہ استعمال:

گائے / بھینس: 5 ملی لیٹر فی 25 کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق پلائیں۔

بھیڑا / بکری: 1 ملی لیٹر فی 4.5 کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق پلائیں۔

احتیاط:

دوا آنکھوں اور جلد پر لگنے سے بچائیں۔

دوران استعمال ربڑ کے دستانے پہنیں، استعمال کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھولیں۔

دوا تازہ جھاڈ ریچنگ گن سے پلائیں۔

دوا کے استعمال کے بعد جانور کا دودھ 5 دن اور گوشت 14 دن تک استعمال نہ کیا جائے۔

دوا کو کمرے کے درجہ حرارت پر سٹور کریں۔ سورج کی روشنی اور حرارت سے بچائیں۔

بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ دوا کو استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلائیں۔



**Sanna Laboratories**

1019-B, P.S.I.E Sargodha Raod, Faisalabad-Pakistan.  
Tel : +92 41 8810170, 8586787 Fax: +92 41 8869292  
Web: www.sannalabs.com, sannalabs@yahoo.com

